育種分野：イオンビーム育種研究

主な研究紹介

これまでに単独で又は大学や公的研究機関、企業と共同で、イオンビーム照射により様々な品種改良を行ってきました。現在も、観賞用植物、イネや麦などの作物の品種改良に取り組んでいます。特に、真菌類（キノコ）をはじめとする菌類の品種改良は、エネ研における特徴的なイオンビーム育種です。

【これまでの主な実績】

- 施設園芸用野菜（トマト等，出願2）
- 観賞用植物（ピンカ等，登録8、出願1）
- 酒造用イネ（出願1）
- 有用物質生産用真菌類（特許1，出願1）
- 有用物質生産用細菌

陽子線と炭素線によってマウス細胞核（赤）上に生じたDNA損傷（黄）
炭素線では1個のイオンの通り道に損傷が集中する。

- ◆水素イオンビーム：透過力が大きく、様々な生物試料に照射可能
- ◆炭素イオンビーム：DNAダメージが大きく、大きな形質変化が生まれやすい

また、更なる品種改良のための照射技術の高度化研究を進めています。

炭素線のような重イオンビームは、1個のイオンが通過経路に大きなエネルギーを与えます。このため、集中的にDNAダメージが形成され、高い突然変異率や、大きな形質変異の頻度増加という特徴的な現象をもたらすと考えられます。

エネ研では、重イオンビームによる突然変異形成の特徴をより有効に活用した品種改良を行うため、照射時に種子などにDNA修復阻害剤で処理を行う技術や、イオンビームの停止間際の大きな付与エネルギーを利用する技術の開発を理化学研究所や福井県立大学と共同で行っています。

福井県の気候に適した山田錦の開発

「山田錦」は、高級ブランドとして人気の高い酒米ですが、低温障害を起こしやすい、背が高くて倒れやすい、といった性質を持っています。そのため、栽培は兵庫県など温和な気候の地域に限られ、福井県での栽培には適していませんでした。また、穂から粃が落ちやすいなど、栽培管理が難しい品種です。そこで、イオンビーム育種法を用いて、品質はそのままに、収穫期を1～2週間早め、草丈が低く（矮性）、穂から粃が落ちにくい（難脱粒性）の特性を持つといった、福井県の気候に適した「山田錦FW1号」を開発しました。

（福井県立大学との共同研究）

【特徴1】福井の気候に合わせて収穫できるよう生長が早い

山田錦FW1号

山田錦(従来種)

山田錦は晩生で、収穫期には福井は気温が低くなり、低温障害で穂が悪くなりやすい。出穂期・収穫期を早め、低温障害を回避する。

【特徴2】背丈が低く倒れにくい

山田錦FW1号

山田錦(従来種)

山田錦は背丈が高く倒れやすいため収量が不安定。背を低くし倒伏を抑える。

【特徴3】実った粃が落ちにくい

山田錦FW1号

山田錦(従来種)

山田錦は脱流量があり、実った粃が収穫時に落ちやすい。難脱粒性にする事で、収穫時に地面に落ちる粃を減らし収量を安定させる。